




Sie haben einen komplexeren Fall, den Sie mit unserem klinischen Team besprechen möchten?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an clinical@flowneuroscience.com – wir unterstützen Sie gerne.

*Bei geringer Therapietreue während der Aktivierungsphase sollten ein Neustart der Behandlung sowie Maßnahmen zur Unterstützung der Adhärenz erwogen werden.

**Erhöhtes Rückfallrisiko bei:

- rezidivierenden Episoden in der Vorgeschichte und/oder früherem unvollständigem Ansprechen
- schwerer Depression in der Vorgeschichte
- körperlichen oder psychischen Begleiterkrankungen
- ungünstigen Bewältigungsstrategien (z. B. Vermeidung, Grübeln)
- persönlichen, sozialen oder umweltbedingten Faktoren, die zur Depression beitragen

Dieser Leitfaden dient ausschließlich Informationszwecken und soll die klinische Entscheidungsfindung unterstützen. Er ersetzt keine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Behandelnde sollten bei der Festlegung des geeigneten Behandlungsplans ihr eigenes klinisches Urteil heranziehen und die individuellen Bedürfnisse und Umstände jeder Patientin und jedes Patienten berücksichtigen.