

# Flow Patienten- profile



# Über dieses Dokument

Dieses Dokument enthält eine Reihe von Patientenprofilen, die Ärztinnen und Ärzten helfen sollen, die möglichen Einsatzbereiche unseres Produkts besser zu verstehen. Jedes Profil zeigt Praxisbeispiele, in denen unsere Technologie erfolgreich eingesetzt wurde, und verdeutlicht, welche Patientinnen und Patienten am meisten davon profitieren können.

## Inhalt

- **Detaillierte Patientenprofile:** Realitätsnahe Beispiele auf Grundlage tatsächlicher klinischer Anwendungsfälle, mit den wichtigsten Indikatoren, Symptomen und Erkrankungen, bei denen sich unser Produkt als wirksam erwiesen hat.
- **Hinweise zur Anwendung:** Wann und wie Sie unser Produkt für Ihre Patientinnen und Patienten in Betracht ziehen können, mit konkreten Empfehlungen für verschiedene klinische Situationen.

## Wichtiger Hinweis zum Datenschutz

Diese Profile basieren auf echten Patientinnen und Patienten. Alle personenbezogenen Daten wurden jedoch entfernt oder anonymisiert, um die Privatsphäre zu schützen. Die Fälle stehen für typische Szenarien und sollen klinische Entscheidungen unterstützen, ohne die Vertraulichkeit zu gefährden.

# Patientenbeispiele



## **Max – 21 Jahre**

Nebenwirkungen unter Antidepressiva



## **Susan – 65 Jahre**

Mehrere Antidepressiva ohne ausreichende Wirkung



## **Thomas – 45 Jahre**

Zögert, eine Behandlung mit Antidepressiva zu beginnen



## **Holly – 30 Jahre**

Familienplanung, möchte Antidepressiva ausschleichen



**Max**

**Alter:** 21

✓ Ansprechen

✓ Remission

### Vorliegende Symptome:

Starke sexuelle Nebenwirkungen und Verschlechterung der depressiven Symptomatik unter Fluoxetin, mit verstärkter Angst und gedrückter Stimmung.

### Vorgeschichte:

Schwere Zwangsstörung seit der Jugend, vor 2 Jahren Diagnose einer Major Depression (MDD).

### Behandlungsplan:

Einführung von Flow vor der Reduktion von Fluoxetin. Angepasstes Behandlungsprotokoll mit verlängerter Aktivierungsphase: 6 Wochen lang 5x, dann 4x und aktuell 3x pro Woche.

### Status:

Deutliche Besserung, nach 10 Wochen in Remission. Beginn des Ausschleichens von Fluoxetin.


## MADRS-s

**Startwert:** 35

**Letzter Wert:** 8

↓ -77,1 %

Punktwert





**Susan**

Alter: 65

✓ Ansprechen

✓ Remission

### Vorliegende Symptome:

Erhöhte Reizbarkeit, schlechter Schlaf, verstärktes Unruhegefühl, Antriebslosigkeit.

### Vorgeschichte:

Chronische depressive Störung (Erstdiagnose vor 20 Jahren). Hat Gesprächstherapie versucht und nimmt ihr drittes Antidepressivum (aktuell 100 mg Sertralin, zuvor Citalopram und Mirtazapin). Aufgrund von Nebenwirkungen fällt ihr die regelmäßige Einnahme schwer und sie möchte die Medikation absetzen.

### Behandlungsplan:

Einführung von Flow vor dem Ausschleichen von Sertralin. Angepasstes Behandlungsprotokoll: 5x, dann 4x pro Woche, um die Stimulationsroutine beizubehalten.

### Status:

Deutliche Besserung nach 6 Wochen, Remission nach 7 Wochen. Sie stimuliert jetzt zur Erhaltung 3x pro Woche, nimmt 50 mg Sertralin und reduziert weiter.


## MADRS-s

Startwert: 24

Letzter Wert: 9

↓ -62,5 %

Punktwert





**Thomas**

Alter: 45

✓ Ansprechen

✓ Remission

### Vorliegende Symptome:

Zunehmendes Grübeln, gedrückte Stimmung, schlechter Schlaf und eingeschränkte Fähigkeit, sich zu konzentrieren oder positive Gewohnheiten aufzubauen. Arbeitet als Führungskraft auf C-Level in einem sehr stressigen Umfeld. Alkoholkonsum auf 35–40 Einheiten pro Woche gestiegen.

### Vorgeschichte:

Keine Vorbehandlung mit Antidepressiva. Chronische depressive Symptome, lehnt eine antidepressive Medikation ab.

### Behandlungsplan:

Einführung von Flow als Alternative zu Antidepressiva. Protokoll: 5x, dann 3x pro Woche.

### Status:

Deutlich verbesserte Symptome bereits nach Woche 1 mit Flow. Remission ab Woche 4 erreicht und gehalten. Der Alkoholkonsum sinkt stetig und liegt derzeit bei 25–30 Einheiten pro Woche.


## MADRS-s

Startwert: 25

Letzter Wert: 9

↓ -64 %

Punktwert





**Holly**

**Alter:** 30

✓ Ansprechen

✓ Remission

### Vorliegende Symptome:

Leichte depressive Symptome, darunter gedrückte Stimmung und Konzentrationsschwierigkeiten.

### Vorgeschichte:

Chronische depressive Symptome, nimmt dauerhaft Fluoxetin. Möchte Fluoxetin im Hinblick auf eine mögliche Schwangerschaft ausschleichen.

### Behandlungsplan:

Einführung von Flow als Zusatzbehandlung. Protokoll: 5x, dann 3x pro Woche.

### Status:

Deutlich verbesserte Symptome nach 2 Wochen mit Flow. Remission ab Woche 8 erreicht und gehalten. Fluoxetin nach 3 Monaten vollständig ausgeschlichen.

## MADRS-s

**Startwert:** 20

**Letzter Wert:** 9

↓ -55 %

Punktwert

